

PIRMOJI PAGALBA



P-P-P taisykliė



1. PATIKRINK

Įsivertink, ar saugu.
Patikrink sąmonę (paklausk, pajudink) ir kvėpavimą (klausyklis, jausk, matyk).



2. PASKAMBINK

Trumpai atsakinėk į klausimus.
Klausyklis nurodymų.
Sulauk atvykstančios pagalbos.



3. PADÉK

Nuramink ir suteik būtinąjį pagalbą.
Nepalik vieno.
Esant poreikiui atlik pradinį gaivinimą.

Gaivinimas

- Jei nukentėjusysis be sąmonės ir nekvėpuoja, kuo skubiau skambinkite **112**, apnuoginkite krūtinę ir pradékite gaivinti.
- Gaivinimas atliekamas ant kieto pagrindo.
- Vienos rankos delno pagrindą padékite ant krūtinės centro, kitą ranką ant jau padėtos. Atlikite **5-6 cm** gylio 30 krūtinės ląstos paspaudimų, 100-120 k./min.
- Atlikę 30 krūtinės ląstos paspaudimų, padarykite 2 įpūtimus. Atlikę 5 ciklus paspaudimų ir įpūtimų santykiu **30:2**, patikrinkite, ar nukentėjusysis atsigavo, jei ne - gaivinkite, kol atvyks greitoji medicinos pagalba arba nukentėjusysis atsigaus pats.

Defibriliacija

Naudodami defibriliatorių (AID) elkités pagal garsines instrukcijas:

- jjunkite;
- priklijuokite elektrodus;
- paspauskite analizės mygtuką;
- vykstant analizei nesilieskite prie paciento;
- AID praneša, ar bus reikalingas elektros šokas;
- tęskite gaivinimą.




Stabili šoninė padėtis

- Ištieskite gulinčiojo kojas.
- Vieną gulinčiojo ranką, esančią prie jūsų, ištieskite į šoną horizontaliai, kitą – permeskite per krūtinės ląstą, delnu prie veido.
- Sulenkite tolimesnę nukentėjusiojo koją per kelio sąnarį ir traukite į save versdami ji ant šono.
- Delnas po apatiniu žandikauliu, o sulenkasis kelis – persisvéręs per apatinę, ištiestą, koją.
- Jvertinkite, ar žmogus kvépuoja.



UŽSPRINGIMAS



Žmogus gali kosėti, yra sąmoningas.


Pagalba: nepalikite vieno, skatinkite kosėti, netrakykite į tarpumentę

Kosulys labai silpnas, girdëti švilpesys, žmogus pradeda mélti, praranda sąmonę.

Pagalba: kvieskite GMP. 5 kartus suduokite į tarpumentę, 5 kartus atlikite Heimlico stūmj. Kartokite, kol žmogus atsprings. Netekus sąmonés pradékite gaivinimą.

Pagalba 112 būtina kvieсти:

- Itariant infarktą ar insultą, jaučiant stiprų, neįprastą skausmą.
- Patyrus galvos, kaklo, nugaros traumas.
- Patyrus stiprią alerginę reakciją, vykstant traukuliams, užspringus.
- Nukentėjusysis nesąmoningas arba jo būklė blogėja.
- Nukentėjusysis sunkiai kvépuoja, dūsta, arba nekvépuoja.



Kraujavimo stabdymo būdai

SILPNO

1. Žaizda nuplaunama ir nusausinama.
2. Ant žaizdos dedama sterili servetėlė, aprišama bintu.
3. Pakeliamas galūnė.
4. Galūnė kiek įmanoma labiau sulenkiamas per sąnarj.
5. Patikrinama, ar nesutriko kraujotaka.

STIPRAUS

1. Ant žaizdos dedamas spaudžiamasis tvarstis arba sterili servetėlė.
2. 2–3 kartus aprišama bintu.
3. Dedamas kitas bintas arba standžiai susuktas audinio ritinėlis, stipriai aprišama bintu.
4. Užspaudžiama ir laikoma bent 3 min.

Turniketas

- Turniketas juosiamas 5–8 cm virš žaizdos, bet ne ant sąnario.
- Apjuosus turniketą, suktuką užveržti taip, kad sustotų kraujavimas.
- Sutvirtinti.
- **Pažymėti laiką.**
- Nepavykus sustabdyti vienu turniketu, antrą juostą aukščiau pirmojo.
- Pažymėti laiką.

SVARBU

Patikrinti, ar tarp turniketo ir galūnės nėra nereikalingų daiktų.

Draudžiama atlaisvinti arba nuimti turniketą. Tai gali daryti tik medicinos darbuotojas.

Stebėti gyvybinius požymius.



PAGALBA

1. Įsitikinkite, kad Jums saugu.
2. Kvieskite pagalbą.
3. Nutraukite žalojančią poveikį.
4. Atvésinkite nudegusią vietą kambario temperatūros vandeniu.
5. Uždenkite nudegusią vietą.

Nudegimas

GALIMI PAVOJAI

- Patalpoje gali būti nuodingų dūmų.
- Negesinkite liepsnos sintetine medžiaga.
- Nenaudokite ledinio vandens.
- Per ilgai nevésinkite nudegusių vietas.
- Nepradurkite pūslių.
- Neplėškite prikibusių drabužių.
- Nedékite tvarsčių ant veido.

