


# PARVOVIRUSINĖS INFEKCIJOS ATVEJO VALDYMO UGDYMO ĮSTAIGOJE ALGORITMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAMS,  
VYKDANTIEMS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE, IR UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS



**Nuoroda į informacinę medžiagą:**

[Parvovirusinė infekcija](#)

[Profilaktikos rekomendacijos](#)

[Daugiau informacijos](#)

\***Ligos požymiai:** Vaikams parvovirusinė infekcija dažniausiai pasireiškia kaip infekcinė eritema (odos paraudimas dėl uždegimo). Iki bėrimo gali būti neaukšta temperatūra. Iš pradžių parausta skruostai, vėliau atsiranda rožinių dėmelių ir papulių (standus odos iškilimas). Išberiamos galūnės ir liemuo. **Atsiradus ligos simptomams, rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją.**

\*\***HN 75:2016** „[Išmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai](#)“